Clitoridoplastie de réduction par laser — indication fonctionnelle

Au cabinet, sous anesthésie locale

01 Qu'est-ce que c'est ?

La clitoridoplastie de réduction porte sur le capuchon clitoridien, le repli de muqueuse qui recouvre le clitoris, et non sur le clitoris lui-même.

Cette fiche remise par le Dr Gatri a pour but de compléter les explications données lors de votre consultation. N'hésitez pas à la solliciter en cas de questions.




FIGURE 1 — La clitoridoplastie de réduction porte sur le capuchon clitoridien, le repli de muqueuse qui recouvre le clitoris, et non sur le clitoris lui-même (schéma, vue de face).

1. Mont du pubis
2. Capuchon clitoridien : l'intervention porte sur lui, et non sur le clitoris
3. Petite lèvre
4. Grande lèvre
5. Périnée
6. Clitoris
7. Méat urétral
8. Petite lèvre
9. Grande lèvre
10. Entrée du vagin
11. Anus

En bleu-vert, entourée de pointillés : la zone concernée par l'intervention.

Vue de face : la droite de l'image est le côté gauche de la patiente.

Schéma Wagram Clinic, 2026.




FIGURE 2 — L'excès du capuchon clitoridien est retiré au laser ; le clitoris n'est pas touché (schéma, vue de face agrandie).

1. Capuchon clitoridien : son excès est retiré au laser
2. Le clitoris n'est pas touché
3. Petites lèvres

En bleu-vert, entourée de pointillés : la zone concernée par l'intervention.

Vue de face agrandie : la droite de l'image est le côté gauche de la patiente. Dans le cadre : la région agrandie.

Quelques points de suture au fil résorbable peuvent être nécessaires ; ce n'est pas systématique.

Schéma Wagram Clinic, 2026.

02 Pourquoi cette intervention ?

Une gêne est liée au capuchon clitoridien.

03 Comment se déroule-t-elle ?

L'intervention se fait à notre cabinet.

L'excès du capuchon clitoridien est retiré au laser ; le clitoris n'est pas touché.

Quelques points de suture au fil résorbable peuvent être nécessaires ; ce n'est pas systématique.

L'anesthésie locale est réalisée par votre médecin au début de l'intervention ; aucun anesthésiste n'intervient.

Vous repartez le jour même. L'intervention dure environ 30 minutes ; la durée de votre présence au cabinet vous est donnée par votre médecin.

04 Ce que l'intervention ne garantit pas

Le résultat ne s'apprécie pas avant deux mois, l'aspect définitif des cicatrices pas avant douze mois. Aucun résultat n'est garanti.

05 Les risques et complications

- Pendant l'intervention, une brûlure de la peau ou de la muqueuse peut survenir au contact du faisceau, ainsi qu'une hémorragie.
- Après l'intervention, un hématome ou une infection peuvent survenir. La douleur, faite de tiraillements attendus, est bien soulagée par des antalgiques simples la première semaine ; la glace réduit le gonflement. Le risque principal est que la cicatrice s'ouvre.
- À distance de l'intervention peuvent apparaître une nécrose de la peau ou de la muqueuse, une cicatrice visible ou sensible, des brides ou des adhérences, des douleurs lors des rapports ou une asymétrie résiduelle. L'altération de la sensibilité est le plus souvent transitoire, avec une récupération en trois à six mois. Un résultat insuffisant peut conduire à une retouche.

06 Les alternatives

Ne pas opérer est toujours possible.

Selon la gêne : des vêtements adaptés, des soins locaux ou l'avis d'un sexologue.

07 Les contre-indications

Tabagisme non arrêté : l'arrêt strict est demandé. Infection génitale ou urinaire en cours. Trouble de la coagulation ou traitement anticoagulant non adapté. Grossesse en cours.

Signalez tous vos traitements, notamment les anticoagulants et les antiagrégants.

08 Avant l'intervention

Pas de jeûne.

Posez la question de la conduite à votre médecin et organisez votre retour en conséquence.

09 Après l'intervention et vos consignes

- Pendant 15 jours après l'intervention : pas de bain, pas de rapports sexuels, pas de piscine.
- La consultation de contrôle a lieu quinze jours après l'intervention.

10 Quand consulter sans attendre

Après votre retour à domicile, si des saignements continus importants, des pertes malodorantes, des douleurs inhabituelles, de la fièvre ou une cicatrice qui s'ouvre apparaissent, il est indispensable d'en informer votre médecin, joignable au cabinet.

11 Vos questions au Dr Gatri

Cette feuille d'information ne peut sans doute pas répondre à toutes vos interrogations. Dans tous les cas, n'hésitez pas à poser au médecin toutes les questions qui vous viennent à l'esprit, oralement ou par écrit.